



Administration d'acétaminophène Procédures



Selon le protocole, l'acétaminophène **ne peut être administré** :

- à des enfants de moins de deux mois;
- pour soulager la douleur;
- pendant plus de 48 heures consécutives (deux jours)
- à des enfants ayant reçu un médicament contenant de l'acétaminophène dans les quatre heures précédentes.

Début d'élévation de la température corporelle (2 mois et plus)

Rectal : 37.5°C et 38°C

Axillaire : 37°C et 37.5°C

État général bon

- Habiller l'enfant confortablement;
- Le faire boire plus souvent;
- Surveillez l'enfant et reprendre la température après 60 minutes ou plus tôt si son état semble se détériorer;
- Informer le parent de l'état de l'enfant.

Début d'élévation de la température (moins de 2 mois)

- Idem, mais il faut appeler le parent pour lui dire de venir chercher l'enfant;
- **Ne jamais administré d'acétaminophène à un enfant de moins de deux mois**

Température normale

Rectale :

37.2°C à 37.5°C

Orale :

35.5°C à 37.5°C

Axillaire :

34.7°C à 37.0°C

Tympanique

35.8°C à 37.5°C :



S'il s'agit de fièvre et que l'enfant a plus de 2 mois

Rectale, orale ou tympanique : 38.0°C (100.4°F)

Axillaire : 37.5°C (99.5°F)

- Habiller l'enfant confortablement;
- Le faire boire plus souvent;
- Surveillez l'enfant;
- Informer le parent de l'état de l'enfant;
- Administrer de l'acétaminophène selon la posologie;
- Une heure après prendre de nouveau la température.
Si elle demeure élevée, demander au parent de venir chercher l'enfant.